

Vaccin Dca1

Vaccin combiné contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos

La va
la r

La vaccination est le meilleur moyen de protection
contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos
et leurs complications.

Maladies	Signes et symptômes	Complications
Diphtérie	<ul style="list-style-type: none">• Maux de gorge importants• Forte fièvre• Problèmes respiratoires et cardiaques	<ul style="list-style-type: none">• Paralyse• Décès (5 à 10% des cas)
Coqueluche	<ul style="list-style-type: none">• Violentes quintes de toux pouvant durer des mois• Difficulté à manger, à boire et à respirer	<ul style="list-style-type: none">• Pneumonie• Convulsions• Dommages au cerveau• Décès (0,4% des cas)
Tétanos	<ul style="list-style-type: none">• Spasmes musculaires de la mâchoire• Spasmes des cordes vocales• Spasmes musculaires de tout le corps	<ul style="list-style-type: none">• Décès (10% des cas)

IMPORTANT

C'est à vous de prendre rendez-vous au CLSC ou chez votre médecin.

Prochain rendez-vous
pour la vaccination :

Renseignements sur le vaccin dcaT

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et Le vaccin dcaT est administré aux personnes âgées de 4 ans et plus qui ont besoin de protection. En général, ce vaccin est donné en 3^e année du secondaire.

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : mal de tête).

Le vaccin dcaT est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorité des cas (plus de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> • Douleur à l'endroit où l'injection a été faite • Fatigue, mal de tête 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer un chiffon froid à l'endroit où l'injection a été faite. • Utiliser un médicament pour la fièvre ou la douleur. • Consulter un professionnel de santé si les symptômes persistent.
Très souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> • Rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite • Malaises, étourdissements, nausées, diarrhée, frissons 	
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre • Perte d'appétit, vomissements • Irritabilité, somnolence (envie de dormir) • Rougeurs sur la peau • Enflure des ganglions 	
Parfois (moins de 1 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> • Petite bosse pendant quelques semaines à l'endroit où l'injection a été faite 	
Très rarement (moins de 1 personne sur 10 000)	<ul style="list-style-type: none"> • Abscès stérile à l'endroit où l'injection a été faite • Douleur intense et faiblesse dans le bras durant plusieurs semaines 	

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les effets secondaires au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront généralement dans les minutes qui suivent la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction sur place.

POUR TOUTE QUESTION, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre professionnel de santé.

Vous pouvez également consulter le site sante.gouv.qc.ca/vaccination/

Vaccin conjugué contre le méningocoque de séro groupe C

La va
la m

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre les infections à méningocoque de séro groupe C et leurs complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 infections graves causées par le méningocoque de séro groupe C. Il existe différents sérogroupes (ou types) de méningocoque, entre autres, les sérogroupes A, B, C, Y et W135. Ce vaccin protège contre le séro groupe C.



Maladie	Signes et symptômes	Complications
Infections à méningocoque de séro groupe C	<ul style="list-style-type: none">• Forte fièvre• Mal de tête important• Nausées et vomissements• Atteinte de l'état général• Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou bleus sur la peau	<ul style="list-style-type: none">• Dommages permanents• Amputation des mains (10 à 15% des cas)• Décès (10 à 15% des cas)

IMPORTANT

C'est à vous de prendre rendez-vous au CLSC ou chez votre médecin pour faire vacciner votre enfant.

Prochain rendez-vous pour la vaccination :

Renseignements sur le vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque de sérogroupe C et leurs complications. Au Québec, ce vaccin est recommandé aux enfants à l'âge de 1 an et en entrée au secondaire.

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : mal de tête).

Le vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C est sécuritaire. La plupart des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorité des cas (plus de 50 % des enfants)	<ul style="list-style-type: none"> • Douleur à l'endroit où l'injection a été faite 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une compresse froide à l'endroit où l'injection a été faite
Très souvent (moins de 50 % des enfants)	<ul style="list-style-type: none"> • Rougeur et gonflement à l'endroit où l'injection a été faite • Fièvre, somnolence (envie de dormir) et irritabilité, surtout chez les enfants âgés de moins de 5 ans • Mal de tête, malaise, douleur musculaire et douleur aux jointures, surtout chez les personnes âgées de 11 ans et plus • Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhée 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un analgésique ou les médicaments recommandés par le médecin ou le pharmacien • Consulter un médecin si les symptômes persistent

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront généralement dans les minutes qui suivent la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction sur place.

POUR TOUTE QUESTION,
adressez-vous à la personne qui donne le vaccin ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre pharmacien.

Vous pouvez également consulter le site sante.gouv.qc.ca/vaccination/